

令和2年度 奥越地区稲作生育状況

コ シ ヒ カ リ	地点名	品種名	栽培方法	移植日	植付本数	栽植密度	苗歳			
	大野-富嶋	コシヒカリ	移植	5月11日	5.8本	17.4株/㎡	2.4			
	調査日	5月28日	6月4日	6月11日	6月18日	6月25日	7月2日	7月9日	7月16日	
	草丈 (cm)	22.4	28.6	29.7	44.9	56.4	60.5	69.7	79.6	
	茎数 (本/株)	5.9	10.1	22.0	25.6	25.9	24.5	24.1	23.0	
	葉色	4.2	4.7	4.5	4.5	4.0	4.0	3.8	3.8	
	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂期	収穫期						
	6月24日	7月12日	8月4日	9月10日						
	地点名	品種名	栽培方法	移植日	植付本数	栽植密度	苗歳			
	勝山-龍谷	コシヒカリ	移植	5月12日	4.6本	18.0株/㎡	2.5			
調査日	5月21日	5月28日	6月4日	6月11日	6月18日	6月25日	7月2日	7月9日	7月16日	
草丈 (cm)	9.8	22.8	24.9	26.7	45.5	54.1	59.0	69.6	77.3	
茎数 (本/株)	4.6	5.0	6.8	17.4	24.4	31.9	30.6	30.9	28.8	
葉色	3.0	4.2	5.5	6.4	7.8	8.6	9.5	10.1	10.8	
最高分けつ期	幼穂形成期	出穂期	収穫期							
6月25日	7月10日	8月5日	9月9日							

五 百 万 石	地点名	品種名	栽培方法	移植日	植付本数	栽植密度	苗歳			
	大野-阿難祖地頭方	五百万石	移植	4月30日	4.3本	17.2株/㎡	3.0			
	調査日	5月21日	5月28日	6月4日	6月11日	6月18日	6月25日			
	草丈 (cm)	20.1	23.0	26.6	30.5	44.0	54.5			
	茎数 (本/株)	5.5	10.3	16.9	20.0	19.1	18.9			
	葉色	5.7	7.1	8.4	9.7	10.8	11.5			
	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂期	収穫期						
	6月10日	6月24日	7月16日	8月25日						
	地点名	品種名	栽培方法	移植日	植付本数	栽植密度	苗歳			
	勝山-龍谷	五百万石	移植	5月3日	4.9本	19.0株/㎡	2.8			
調査日	5月21日	5月28日	6月4日	6月11日	6月18日	6月25日	7月2日	7月9日		
草丈 (cm)	15.2	20.5	22.9	25.9	42.7	53.8	59.1	68.9		
茎数 (本/株)	4.9	5.6	6.7	18.4	20.7	22.3	21.6	20.6		
葉色	3.7	4.2	4.7	4.8	4.3	5.2	4.6	4.8		
最高分けつ期	幼穂形成期	出穂期	収穫期							
6月25日	7月1日	7月22日	8月27日							

ハ ナ エ チ ゼ ン	地点名	品種名	栽培方法	移植日	植付本数	栽植密度	苗歳			
	大野-平澤領家	ハナエチゼン	移植	5月3日	2.9本	17.5株/㎡	3.5			
	調査日	5月21日	5月28日	6月4日	6月11日	6月18日	6月25日			
	草丈 (cm)	16.4	22.4	23.3	29.2	34.9	40.5			
	茎数 (本/株)	3.1	4.0	7.8	12.7	18.8	23.9			
	葉色	4.3	4.4	4.3	3.8	3.8	4.0			
	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂期	収穫期						
	6月24日	6月24日	7月18日	8月23日						