


きょう りゅう 強粒 エクスプレス KYO-RYU EXPRESS

多収米の産地化で持続性の高い農業を目指して!!

福井地方気象台は4月の福井の平均気温は13.0℃（平年差+0.2℃）と発表しました。4月末から5月上旬にかけて多収米「つくばSD1号・しきゆたか」の移植・直播の作業が始まりました。5月上・中旬は温度が上がってこず、最近になりやっと根も活かし・色が上がっている状況です。また、4月26日～5月3日にかけては、寒気の影響で「つくばSD1号・しきゆたか」の田植えには苦労されたかと思います。これからの管理で強い粒づくり（大粒・多収）を目指していきます。

1. 多収米作付け後の気象



現在の生育状況(5月26日)
つくばSD1号・しきゆたか(平年比)
●(移植)茎数: 少ない
●(直播)茎数: 並み

3. 気象回復の見込み


週間天気予報: 今後、天候は回復する見込みです。天候や生育状況に応じた管理をしましょう。

6月					
1日	2日	3日	4日	5日	6日
火	水	木	金	土	日
晴時々曇	晴時々曇	曇	晴時々曇	晴時々曇	晴時々曇
10	20	40	70	30	30

3. 生育のイメージ(茎数増加)

つくばSD1号


茎数の推移(過去5年平均値)



4. 適期中干しの実施

中干し作業は、多収穫を図るために大変重要な管理です。生育状況を見ながら適期に適度な中干し管理を励行しましょう。

- ① 中干しの多収穫効果(適正茎数・粒数と登熟向上)
- 無効分げつの抑制
 - 受光体制の向上
 - 倒伏防止
 - 根の活性化



溝切りで中干し効果アップ

土壌タイプ(生育状況)と中干し

- 粘土土壌(湿田)
- 生育過剰

強め(早め)
の中干し

- 砂質土壌(乾田)
- 生育不足

弱め(遅め)
の中干し

しきゆたか

茎数の推移(過去5年平均値)

