



# つくばSD1号 速報



## No.5

J A 福井県  
福井基幹支店  
多収米部会

目標単収を適期管理で越えていく!!

● 間もなく幼穂形成期、間断通水の実施。イモチ病・紋枯病の発生に注意。

### 1. J A 生育調査状況 (6月24日現在)



栽培区分	年度	平均作業日	草丈 cm	茎数 m <sup>2</sup>	葉令	葉色
移植	R3	5月2日	45.6	423.6	8.6	4.6
	R2	5月2日	57.7	450.3	9.6	4.9
直播	R3	5月9日	35.0	561.0		4.5
	R2	5月5日	48.1	615.7	7.8	4.3

6月18日から北陸地方は梅雨入りをし、天候は不安定な時期になりますので、気象状況を常に把握し、適切な栽培管理に努めてください。

#### つくばSD1号の栽培管理ポイント

長雨、日照不足が続く病害虫が出やすい状況になります。特にいもち病・紋枯病が出やすい時期ですので適期の防除対策に努めていきましょう。また、多収穫に向けて、今後の肥培管理は重要です。適切な管理を実施下さい。

### 2. 茎数の推移と今後の管理



#### 移植

移植当初は生育が遅れてきている状況でしたがある程度平年並みになってきました。今週中には有効茎数450本/m<sup>2</sup>を超えてきますので間断通水の実施し、根の活力維持を図りましょう。

- いもち病対策  
ブラシン粉剤(3~4kg/10a) 治療剤  
収穫7日前まで
- 紋枯れ病対策  
リンバー粒剤(3~4kg/10a)  
収穫30日前まで(使用回数2回以内)

#### 直播


直播の生育は、現在、茎数は550本/m<sup>2</sup>を超えました。過剰分けつによる収量減を防止するため、圃場や生育にあった中干しを継続しましょう。過繁茂の圃場では強めに中干しを。

### 3. 中干し後の水管理


中干し終了後は浅水の通水を実施し、うわ根の発生促進や根の健全化に努めましょう。

- 移植 6/29~(幼穂形成期)
- 直播 7/5~(幼穂形成期)

- 移植は、中干を終了し間断通水を行いましょ。
- 入水:水位:3程度
- この水管理の繰り返し



間断通水で多収穫!!  
中干し終了後の水管理



足跡や溝に水が残っている状態で再び入水。 湯かし過ぎないように!!

的確な水管理で、収量アップを目指しましょう。今週の多収米速報は『西部支店』が担当しました。