

水稻 斑点米防止へ! カメムシの徹底防除を!

茶碗 1 杯の米 (2,500 粒≒50 匁) の中に斑点米が 3 粒以上あると 2 等米に格下げになります。カメムシ防除をしっかり行いましょう。

斑点米防止は

カメムシ防除の
徹底から!



カメムシ類による
斑点米

●ラジヘリ防除を含めてカメムシの防除を必ず実施して下さい。

●仕上げ防除を実施しましょう。



アカスジ
カスミカメ



アカヒゲホソミドリ
カスミカメ



トゲシラホシ
カメムシ



カメムシ類による
斑点米



イネアザミウマ

土づくり肥料予約月間 (必要な肥料を予約注文で!)

土づくり肥料の使用例

	品 名	荷姿	特 徴	必要量(10 ^a 畝当り)
土壌改良資材	元氣3兄弟	20 ^{kg}	ケイ酸、リン酸、加里を主として、苦土や鉄も補給できる省力土づくり資材。大粒化により、タンパク含有率の低い美味しい米づくりに役立ちます。	60 ^{kg} (3袋) + 石灰窒素または腐熟促進剤
	いね一番	20 ^{kg}	稲わらを腐熟させる「石灰窒素」を含有します。食味を上げる「苦土」を含有します。異常気象に強くなる「リン酸」を含有します。	60 ^{kg} ~80 ^{kg} (3~4袋) 9月中に散布
	とれ太郎	20 ^{kg}	作物へのケイ酸吸収が高く、施肥量・労力の軽減を可能とする、省力タイプの土づくり資材です。	60 ^{kg} ~80 ^{kg} (3~4袋) + 石灰窒素または腐熟促進剤
	輸入ようりん(粒)	20 ^{kg}	リン酸で地力を高め、酸性土壌を直します。苦土、ケイ酸分の補給により、バランスの良い土づくりに効果的です。	60 ^{kg} (3袋) + 腐熟促進剤
	ケイカル(粒)	20 ^{kg}	稲に必要なケイ酸分を補給します。	200 ^{kg} (10袋) + 石灰窒素または腐熟促進剤
	ニュー地力アップ28号	20 ^{kg}	ようりん(20 ^{kg})とケイカル(80 ^{kg})を含む一粒品。酸性土壌を直すほかに、苦土、微量要素補給に役立ちます。	200 ^{kg} (10袋) + 腐熟促進剤
腐熟促進剤	石灰窒素粒(輸入)	20 ^{kg}	稲わら腐熟促進 秋施用	20 ^{kg} (1袋)
	わらゴールド	15 ^{kg}	稲わら腐熟促進 秋施用	30 ^{kg} (2袋)

★いね一番(石灰窒素含む)・石灰窒素は、肥沃田での使用については控える。

★石灰窒素成分…窒素20% アルカリ分50%

若狭地域では、こんな養分が不足しています

●ケイ酸が少ない

イネはケイ酸を窒素の約10倍吸収し、不足すると明らかに生育、収量が低下します。ケイ酸は茎葉を剛直にして倒伏を防止するとともに光合成量を増加し、登熟歩合を向上させます。また病害虫に対する抵抗力を強める働きがあります。

●リン酸が少ない

イネにとって、分けつ初期～最高分けつ期に一番必要です。特に寒冷地では初期の分けつ確保や収量に大きく影響します。



農作業中の熱中症に注意しましょう！

基本的な熱中症対策

- 作業は気温の高い時間帯を外す
- 作業前・作業中の水分・塩分補給、こまめな休憩
 - ・のどが乾いていなくても20分おきに休憩と水分補給
 - ・塩分摂取（スポーツ飲料、塩分補給用タブレットも可）
- 熱中症予防グッズの活用
 - ・屋外では帽子、吸汗速乾性素材の衣服、屋内では送風機やスポットクーラーなど
- 単独作業は避ける
 - ・作業は2人以上で行うか、時間を決めて声かけ

それでも体調が悪くなったら

①すぐに作業を中断

②応急措置

- ・涼しい場所に避難
- ・服を緩める
- ・水などで体を冷やす、水分補給

（応急処置で症状が改善しない場合は）

③迷わず病院へ

