



スイートコーン栽培管理 No.2

収量目標 3,000本以上/10aを目指して!!

J A 福井県
福井基幹支店

● 適期の栽培管理で収量・品質をアップしましょう!!

1. 除草について

植穴等に雑草が多発する場合がありますので、播種または移植後に除草剤を散布しましょう!
 <<播種後に使用する除草剤>>

薬剤名	使用時期	薬量 (ml/10a)	希釈水量(ℓ /10a)	使用回数	使用方法
ゴーゴーサン乳剤	播種後出芽前 (雑草発生前)	200~400	70~150	1回	全面土壌散布
ゲザプリムフロアブル	播種後とうもろこし 2~4葉期	100~200	50~100	1回	全面土壌散布及び 雑草茎葉散布

2. 追肥について

★ポイント

- 追肥のタイミング…草丈40cm程度の頃、本葉5~6枚)
- ※葉数7~8枚頃に雌穂が分化するため、ストレスがかからないよう追肥が遅れないように注意!!
- ※追肥散布時には、新葉(生長点)にかからないように注意!
- 施肥量 * チツソで5~6kg/10a(例:アグリフラッシュ40kg/10a)

草丈
40cm



3. アワノメイガ・アブラムシ対策

★ポイント

- 雄花抽出後に3回の防除をおこないきましょう!!
- ※パダン粒剤やパダンSG水溶剤の使用は1回だけにしましょう。



○虫を見つけてからでは手遅れです! 早めの防除を心掛けましょう!!

	時期	薬剤
1回目	雄花抽出初め (雄花に散布)	パダン粒剤6kg/10a (又は、パダンSG水溶剤1,000倍 70ℓ/10a以上)
2回目	雌花絹糸抽出期 (1回目の7~10日後)	プレバゾンFL2,000倍+モスピラン顆粒水和剤2,000倍 ※2剤を混用100ℓ/10a
3回目	2回目の7日後	アフーム乳剤1,500倍 150ℓ/10a

※必ず展着剤を添加!



防除①: 雄花抽出初

防除②: 雄花開花、絹糸

防除③: 雄花開花