

つくばSD1号 速報 No.3

多収米 生育調査

福井県 JA福井県 多収米部会

大手コンビニ・レストラン全国で親しまれる多収米!!

令和4年6月9日

●来週が中干し適期です。中干しの遅れによる過剰分けつ注意!


1. JA生育調査状況 (6月8日現在)

栽培区分	年度	平均作業日	草丈 cm	茎数 本/m ²	葉令	葉色
移植	R4	4月30日	30.7	189.6	—	4.1
	R3	5月2日	28.6	205.2	5.8	4.5
直播	R4	—	—	—	—	—
	R3	5月9日	21.7	236.0	—	4.5

5月中旬から続いた好天の影響で「つくばSD1号」の生育は前年並みです。今週に入り降雨が多くなり、今後も不安定な天候が予想されます。圃場の茎数を確認して遅れずに中干しを行いましょ。また、梅雨入りも近いことで、いもち病を中心とした病害虫の発生が懸念されるので圃場をよく観察しながらこれからの管理をお願いします。

2. 茎数の推移と今後の管理

移植



直播



つくばSD1号の栽培管理ポイント

生育状況は、移植日(直播日)や肥培管理により各圃場で差があります。生育状況に応じた管理を行いましょ。

移植

中干し開始は来週末と予想されます。例年より現在の生育は遅れ気味です。ただし、例年、茎数が多く推移する圃場の場合は早めに中干しを開始してください。

直播

浅水管理をおこない、茎数を増やしましょ。丈夫な茎が多いとある程度は倒伏にも耐えられます。雑草の発生に注意しこまめに圃場を観察しましょ。

取りこぼし雑草管理

②中干し期間の雑草対策

ヒエ・ホタルイなどの雑草が残っている圃場は遅れずに除草剤を散布しましょ。

- 広葉雑草: バサグラン(落水散布)
- ヒエ+広葉雑草: ヒエクリーンバサグラン粒剤(浅く湛水して散布)
- クリンチャーバスME液剤(落水散布)

中干し期間は、落水散布の除草剤を使用しましょ。

3. 溝切りの効果

溝切りで多収獲を目指す!!

溝切りは、落水3~7日後、田面がやや固まった状態で実施。溝切り間隔は5m。

『溝切り効果』

- 登熟良好: 中干しと併せ無効分けつを抑える。
- 穂実向上: 後半までの間断通水。
- 品質・収量アップ: 落水適期まで灌水管理。
- 収穫作業が容易: 落水が速やかで、コンバイン作業がし易い。

田面を固め、入水すると溝切りし易い。



適期管理で収量アップを目指しましょ。今週のつくばSD1号速報は『東部支店』が担当しました。