

レッドビーンズ


No.4

『ダルマササゲ栽培情報』

JA福井県
【福井基幹支店】

栽培のポイント


6月24日の雨風によりダルマササゲの倒伏が見られます。特に、一畝に2列播きや2粒播きは、草丈が伸びやすいため、今後、倒伏の対策が必要です。支柱を立て、ネットやひもで対策をしましょう。また、手と呼ばれ枝が伸びていますが、栽培は放任しても問題はありません。今後も生育状況や病害虫の発生に注意しながら、適正な肥培管理を行いましょう。



手と呼ばれる『枝』は、肥料分が多いと長く伸びる。摘み取ってもよいが、栽培面積が大きい場合は、放任でもよい。

【倒伏対策:支柱立て】

草丈が低い為本格的な支柱は必要ありませんが、倒伏を防ぐため、短い支柱を立て、ひもなどで縛る。株が倒れずに育つため、汚れないきれいな莢を育てることができます。



2列植えや2粒播きは、過密になりやすく、倒伏しやすくなる。倒伏が大きくなると、品質が低下するだけでなく、収穫作業に時間がかかります。

2. アブラムシ防除

アブラムシの発生は、一般的には降雨が少なく、乾燥した条件で発生が多い。防除を怠ると短期間のうちに高密度になり、被害が発生しやすい。

〈害虫防除〉

病害虫名	薬剤	希釈	回数	散布時期
ハスモンヨトウムシ アブラムシ	トレボン乳剤	1000倍	2回	14日前
アブラムシ	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	3回	7日前

梅雨明けしたので、
高温乾燥に注意!!



病害虫防除で収量アップを目指しましょう。今回の『レッドビーンズ』は美山支店が担当しました。