

ショウガで福井を元気に!!

Ginger Girls

7月

ジンジャーガールズ

令和4年7月21日
JA福井県
福井基幹支店

6月28日に北陸地方の梅雨明け（速報値）が発表されました。1951年からの統計で史上初の6月の梅雨明けとなり、梅雨の期間も14日間と異例の短さでした。期間中は梅雨らしい雨も降らず水不足が心配されました。7月に入ると一転、大雨が続き9日には記録的短時間大雨情報が発令され、荒れた天候となりました。やはり早めの排水対策が重要になったと思います。今後の天候は35度を超す猛暑日が続くと予想されますので、灌水と追肥を忘れずに行い収量を上げていきましょう。また、熱中症とコロナ感染に気をつけながら暑い夏を乗り切りましょう。

1. 7月14日ショウガ圃場の巡回を行いました。

北部エリア・美山エリア・東部エリア・南部エリアを巡回しました。

6月28日（火）の圃場巡回で回れなかったエリア（地区）を巡回しました。

●北部エリア（写真は抜粋）



●美山エリア（写真は抜粋）



●東部エリア（写真は抜粋）



●南部エリア（写真は抜粋）



アワノメイガの被害が見られたので今後も要注意!




栽培ポイント：種ショウガの10倍増を目指しましょう。

2. ショウガの成長と今後の管理

★高温対策でこまめな灌水と乾燥からしょうがを守りましょう。



★今後は、こまめな灌水を早朝か夕方に行いましょう。



種ショウガ【図は、2次茎以降の葉を省略しています。】

追肥と土寄せの重要性

生育不良や葉色が薄い場合は積極的な追肥と土寄せを行いましょう。特に近年、異常気象による高温や大雨が発生しています。肥料切れや流亡が見られます。注意しましょう。ショウガが露出している場合は、再度、土寄せをおこないましょう。また、乾燥対策として敷きワラをしましょう。

3. アワノメイガ防除のポイント




5月、6月が天気が良く気温も高かったので害虫の発生サイクルが早くなっています。また、発生密度も高く被害が拡大しています。観察して早めの防除を徹底しましょう!

早期発見

- 圃場への成虫の飛来。
- 葉裏に卵をウロコ状に産み付ける。
- 幼虫は、葉裏を食害する。

適期防除

- 上記を確認したら、早急に防除する。
- 薬剤防除は、夕方が最も効果的です。



病害虫名	農薬名	希釈倍数	使用時期	使用回数
アワノメイガ	バダンSG水溶剤	1,500倍	収穫7日前まで	5回以内
フキノメイガ				
ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	1,000倍	収穫7日前まで	3回以内
白星病	ダコニール1000	1,000倍	収穫14日前まで	5回以内



実際の被害

『各種コンテストの開催について』

今年度も各コンテスト開催を計画してします。

★しょうが畑コンクール（8月下旬～9月上旬にて審査で各地区にて事前大募集）

・自薦・他薦は問いません！入賞商品もありますので、ぜひ自慢の畑を大募集!