

越南305号 速報

NEW 多収米 生育調査

サンマルゴ
ゴウ

NO. 9
令和4年 7月21日
福井基幹支店
JA福井県
多収米部会

福井の地から世界に羽ばたく輸出用米 新・多収品種!!


●出穂直前！適期病害虫防除に向け準備を！！

1. JA生育調査状況（7月20日現在）

栽培区分	平均作業日	草丈 cm	茎数 本/m ²	葉令	葉色
移植	4月26日	95.5	483.1	11.5	4.1

7月16～18日の3連休は激しい降雨や強い日差しなど天気模様は色々ありました。今週に入り、越南305号の走り穂が確認されています。現在、収穫に大きく影響を及ぼすような病気の発生は確認されていませんが、今後の天候具合では発病も考えられますので、今後も稲体の状況を確認し3種混合剤などの散布で発病抑制に努めましょう。

2. 茎数の推移と今後の管理



斑点米カメムシ類の防除

- 防除は適期を逃さず2回実施しましょう。
- 1回目：穂揃い期(出穂3～5日後頃)
- 2回目：糊熟初期(出穂10～14日頃)
- ※8月下旬頃にカメムシ多発の場合 仕上げ防除(3回目)を行いましょう。




■ アカスジカスミカメ ■ クモヘリカメムシ

3. 越南305号の栽培管理のポイント！

出穂期

登熟期



区分	薬剤名	収穫前日数
粉剤	スタークル粉剤DL	7日前
	ダントツH粉剤DL	7日前
	トレボン粉剤DL	7日前
液剤	ダントツフロアブル	7日前
	スタークル液剤	7日前
	トレボンスターフロアブル	14日前

- 間断通水を継続し、出穂後フェーン現象等の異常高温時には湛水管理を行いましょう。
- いもち病への発病は減収に繋がる場合があります。病斑を確認したら治療剤などで速やかに防除を行いましょう。

暑い日が続きます。こまめな休憩と水分補給で熱中症対策に努めましよう！

適期管理で収量アップを目指ましよう。今週の越南305号速報は『中央支店』が担当ましました。