



キャベツ・ブロッコリーの  
品質・収量向上を目指して!!

# No.5

福井基幹支店  
水田園芸専門部会

10月の気象(天気)は数日の周期で変わり、気温は高い確率50%の見込みです。気温の低下とともに、発生する病害虫が変わってきます。圃場巡回を行い適期防除に努めましょう。また、薬剤散布は、抵抗性回避のため系統の違う殺虫剤とのローテーション防除を徹底し、葉の裏側にもよくかかるようにして、葉全体に薬液が付着するようにしましょう。

## 1. キャベツ防除管理

### ①基幹防除



定植後	効果	薬剤	対象	希釈倍率	使用時期	使用回数
10月上旬 (結球始)	殺虫	プレオフロアブル	アオムシ、ウワバ類、オオタバコガ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	1,000	7日前	2回
	殺菌	バリダシン液剤5	株腐病、黒腐病、軟腐病	800	7日前	5回
10月中旬	殺虫	ランネート45DF	アオムシ、アブラムシ類、コナガ、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	1,000~2,000	14日前	3回
	殺菌	アミスター20フロアブル	株腐病、菌核病、黒斑病	2,000	7日前	4回
10月下旬	殺虫	アフームエクセラ 顆粒水和剤	アオムシ、コナガ、タマナギンウワバ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	1,000~1,500	7日前	3回
	殺菌	アフエットフロアブル	株腐病、菌核病、黒斑病	2,000	前日	3回
11月上中旬	殺虫	プレバソン5フロアブル	アオムシ、オオタバコガ、コナガ、ヨトウムシ、ウワバ類、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ	2,000	前日	3回
	殺菌	セイビアーフロアブル20	株腐病、菌核病	1000	3日前	3回

### ②臨機防除

	効果	薬剤	対象	希釈倍率	使用時期	使用回数
臨機防除	殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	アオムシ、コナガ	1,000~2,000	7日前で	5回
			アザミウマ類、アブラムシ類	2,000~4,000		
	殺虫	マラソン乳剤	アオムシ、カブラハバチ	1,000	前日	5回
			アザミウマ類、アブラムシ類	2,000~3,000		
	殺虫	アフーム乳剤	アオムシ、コナガ、タマナギンウワバ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	1,000~2,000	前日	3回
殺虫	トルネードエースDF	アオムシ、コナガ	1,000~2,000	7日前	2回	
		タマナギンウワバ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ	2,000			
殺菌	アミスター20フロアブル	株腐病、菌核病、黒斑病		2,000	7日前	4回