

ICS6号『幸の栖』速報 No.2

Commercial.Rice

COMMERCIAL RICE ICS6号『幸の栖』6

J A 福井県

5月の中～下旬にかけて平年より気温が高かったため、ワキが発生しています。茎数増加が遅い、葉色の変色や薄い場合は一次的に落水・田干しを行い、土中に溜まったガス抜き、根の活力・活性化を図りましょう。生育状況(茎数)は、移植日や圃場の条件によって異なります。茎数や葉色に応じた管理を行いましょう。

1. J A 生育調査状況 (6月12日現在)

栽培区分	平均作業日	草丈 cm	茎数 本/㎡	葉令	葉色
移植	4月28日	39.8	384.9	-	4.5


【生育調査状況】

- 6月に入り茎数が急激に増えた
- 目標茎数を確認し、中干し溝切りの実施



2. 茎数の推移と今後の管理

移植 4月28日～



3. ICS6号栽培管理のポイント！

ICS6号は、来週にかけて、出穂40日前になります。出穂40日前は、栄養生長(体作り)から生殖生長(穂作り)への転換期といわれ、その時期のイネの草姿が最も重要です。多収穫を目指して、この時期をうまく切り替える管理をしましょう。

【生育の目安】

栄養生長 (体作り)

6/18 — 6/28 — 7/28

出穂40日前

出穂30日前

出穂

生殖生長 (穂作り)

幼穂形成期

中干し・溝切り

重点管理

中干し作業は、多収穫と良質米を生産するために大変重要な管理です。適期の管理を励行しましょう。

茎数・葉色
に注意!!

病害虫防除