

福井の稲作を『強い粒づくり』大粒&多収でつなぐ  
令和6年6月28日

商社多収米  
KYOU-RYU. ESPRESS

# しきゆたか速報

福井No.1単収を目指して!!

## No.4 J A 福井県

6月22日から北陸地方は梅雨入りし、平年と比べ11日遅い状況となりました。今後も不安定な天候が続く予報となっています。生育管理は過剰分げつを抑えるよう適切な水管理を努めてください。また、暖冬の影響もあり斑点米カメムシが多い予想です。畦畔の除草を実施し、防除に努めましょう。

### 1. J A 生育調査状況 (6月26日現在)

| 栽培区分 | 平均作業日 | 草丈cm | 茎数本/m <sup>2</sup> | 葉令 | 葉色  |
|------|-------|------|--------------------|----|-----|
| 移植   | -     | 43.6 | 404.8              | -  | 4.0 |

#### 【生育調査状況】



茎数が減少してきました。最高茎数は先週あたりだと思われます。

#### 【平年比】

- 草丈 : 短い
- 茎数 : 少ない



### 2. 茎数の推移と今後の管理



### 3. しきゆたか栽培管理のポイント！

#### 【中干の程度】

- 幼穂形成期直前(7月上旬)まで。
- 圃場の状況に応じて実施。  
過剰中干しは根を傷め、胴割粒、乳白粒の発生助長します。  
過繁茂の圃場は強めの中干し。


#### 【中干し目安】

- 粘土土壌(湿田)
- 生育過剰

強め(早め)  
の中干し

- 砂質土壌(乾田)
- 生育不足

弱め(遅め)  
の中干し



#### 取りこぼし雑草管理

- イネ科(ヒエ): クリンチャー粒剤(湛水散布)  
トドMF粒剤(湛水散布)
- 広葉雑草: バサگران(落水散布)
- ヒエ+広葉雑草: ヒエクリーンバサگران粒剤  
(浅く湛水して散布)

#### 過剰分げつはダメ!!

- 倒伏しやすい
- 登熟低下
- 高タンパク値米
- くず米の増加