



# 『幸の栖』速報 No.4



Commercial.Rice

J A福井県

前週から今週にかけて、草丈や茎数が倍近くに増えました。目標の茎数が確保されたことから今後は間断通水をおこない適正な生育を目指しましょう。梅雨入りし一部いもち病が心配されます。あらかじめ粒剤の散布で予

## 1. J A 生育調査状況 (6月26日現在)

栽培区分	平均作業日	草丈 cm	茎数 本/m <sup>2</sup>	葉令	葉色
移植	4月28日	64.4	467.6	-	4.5

【生育調査状況】


先週と茎数がほぼ横ばいで  
す。茎数の最高値に達した

【平年比】

- 草丈 : 長い
- 茎数 : 多い



## 2. 茎数の推移と今後の管理



## 3. ICS6号栽培管理のポイント!



### ① 紋枯病対策

前年に発生した圃場や分けつが多い圃場では発生が助長されます。株本を確認し病斑が見られたら、薬剤防除を実施しましょう。



### 【リンパー粒剤】

- 散布時期 : 出穂5~30日前 (収穫30日前まで)
- 使用量 : 3~4kg/10a
- 使用回数 : 2回以内



(湛水状態で散布し、3~4日間は湛水を保つ)



【出穂】