

福井の稲作を『強い粒づくり』大粒&多収でつなぐ
 令和6年7月5日
 商社多収米 KYOU-RYU. EXPRESS
しきゆたか速報
 福井No.1 単収を目指して!!
 No.5 J A 福井県

今週は梅雨前線の影響もあり、降雨が続いております。昨年は早めの梅雨明けもあり天候は良かったものの、今週末から来週にかけて不安定な天候が続く予報となっています。いもち病が発生しやすい天候となりますので、稲体の状況はこまめに確認しましょう。また、発病が確認されたら天気の間で早急に防除を実施しましょう。

1. J A 生育調査状況 (7月3日現在)

栽培区分	平均作業日	草丈 cm	茎数 本/㎡	葉令	葉色
移植	-	53.4	338.6	-	4.0

【生育調査状況】

茎数が先々週に引き続き大幅に減ってきました。


【平年比】

- 草丈 : 短い
- 茎数 : 少ない
- 葉色 : 並み



2. 茎数の推移と今後の管理

移植 5月2日



直播 5月6日



3. しきゆたか栽培管理のポイント!

☆中干し継続 : 幼穂形成期直前まで

葉色の管理

- 水管理で一発肥料の効果を高める。
- 葉色が4以下の場合は穂肥を散布。

葉色の低下(肥料不足)は未熟粒や乳白粒の増加で、低単収・等級落ちに!!

葉色によっては追肥の検討が必要です!



☆病害対策

いもち病対策

梅雨に入り天候不良の日が続きます。稲体を確認し、いもち病発生が見られたら至急、薬剤防除を実施しましょう。



○ブラシ粉剤(治療剤)

3~4kg/10a 収穫7日前まで
使用回数2回以内

☆カメムシ対策

7月6日・7日は
畦畔草刈実践示一

