

ICS6号『幸の栖』速報 No.6

Commercial.Rice

JA福井県

梅雨入りで雨の日が多く、いもち病の発生が心配されますので基幹防除の徹底をお願いいたします。生育は平年並みで推移されています。

1. JA生育調査状況（7月10日現在）

栽培区分	平均作業日	草丈cm	茎数本/m ²	葉令	葉色	幼穂
移植	4月28日	88.5	427.5	-	5.3	7.5cm


【生育調査状況】

来週末には、早い圃場では出穂を迎える見込みです。

【平年比】

- 草丈 : 長い
- 茎数 : 多い
- 葉色 : 並み

2. 茎数の推移と今後の管理



3. ICS6号栽培管理のポイント！

いもち 紋枯れの防除・葉色が淡い場合は、追肥を検討しましょう

★多収米は未熟粒(乳白粒)が多い

★未熟粒(乳白粒)を整粒に変える肥培管理!!




いもち病対策

稲体を確認し、いもち病発生が見られたら至急、薬剤防除を実施しましょう。

* 感染好適条件

- 平均気温20～25℃が5日間
- 弱い雨や露などで葉が長時間濡れる



(1等:70%以上・2等:60%以上)

- 水管理: 間断通水
- 穂肥: N1～2kg、出穂直前まで
- 病虫害防除
紋枯れ・イモチ: 防除剤の散布
カメムシ対策: 殺虫剤の散布