



シャインパール7 速報


WORLD. RICE

JA福井県


[No.2]

例年、田植えから約1か月で茎数が急激に増え始めます。気象庁の今後1か月予報によると、期間の前半は気温の変動が大きい見込みです。このため栽培管理には特に注意しましょう。また本県では例年6月上旬から中旬に梅雨入りします。今後の天気予報を十分に確認し、適切な水管理と軽めの田干しでワキ(ガス)の発生を抑えましょう!

1. 気象状況について



2. 生育状況(茎数の推移)について




草丈は昨年より短く、茎数もやや少ないですが、葉色も薄い中でも、生育自体は良好です。気象条件次第で生育状況は大きく変動するため、今後も細やかな栽培管理を心がけましょう。

栽培区分	平均作業日	草丈 (cm)	茎数 (㎡)	葉色
移植	4月27日	27.1	107.2	3.5

- 中干しまでは浅水管理で分けつ促進
- 溝切機の準備(メンテナンス)

3. シャインパール栽培のポイント

- シャインパールは茎数が増えにくい品種です。
- 今後も有効茎数確保に向けて浅水管理を行いましょう。
- ワキが発生した場合、一時的な落水(田干し)で根の活力低下を防ぎましょう。



県域多収米「シャインパール」のお問い合わせは、各地区担当営農指導員までお願いします。