

令和7年6月6日
JA福井県
多収米協議会

福井の稲作を『強い粒づくり』大粒&多収でつなぐ

多収米

にじのきらめき速報


RAINBOW RICE

【No.3】

● 浅水管理の徹底で分けつ促進！

田植え・直播後の気象は、5月中旬が高温、5月末が低温・日照不足となり『にじのきらめき』の栽培管理にご苦労されていると思います。生育の進捗は、連休植えの品種全般でやや遅い状況です。天候は今後も、短い周期で変動予想され、中下旬は曇りや雨の日が多くなる見込みです。もうすぐ梅雨入りを迎えますので、浅水管理と軽めの田干しで生育促進を図りましょう。

【栽培区分】多収米アンケート春版
6月6日現在



1. 生育状況について(6月6日現在)


①JA全体

栽培区分	年度	移植日(平均)	草丈(cm)	茎数(本/㎡)	葉色
移植	R7	5月10日	28.7	148.0	4.4
	R6	5月20日	25.2	63.7	3.5


②各地区の状況

栽培区分	地区	移植日(平均)	草丈(cm)	茎数(本/㎡)	葉色
移植	福井	5/11	31	154.7	4.2
	坂井	5/10	27.4	122.3	3.5
	丹南	5/8	27.6	167.0	5.5

2. 茎数の推移について



気象状況(日照時間)




5月下旬の日照時間は、平年比73%でした。『にじのきらめき』その他品種も、5月連休後に田植えた品種は生育が緩慢気味です。

3. にじのきらめきの栽培ポイント

5月下旬の日照不足と深水により、一部の圃場で稲の生長徒長が見られます。浅水管理や田干しを実施しましょう。

【浅水管理⇒分けつ促進】



【中後期除草剤の散布】

雑草の取りこぼしや例年、雑草が多発する圃場では、こまめに観察し、早期の対応を行いましょう。

雑草区分	資材名	形状
ヒエ	クリンチャー	粒・EW
	中後期剤	粒
広葉	バサグラン	粒・液

県域多収米「にじのきらめき」のお問い合わせは、各地区担当営農指導員までお願いします。