



シャインパール7

WORLD. RICE

【No.4】

● 中干しの準備を!!

5月末頃の日照不足もありましたが、先週からの気温上昇と共に順調に生育してきました。早いところでは中干しの時期を迎えていますので、遅れないように実施してください。目標茎数に達していない場合は、茎数確保のため2～3cm水深の浅水管理を続けましょう。北陸地方は6/10に梅雨入りしました。シャインパールはいもち病に弱い品種のため、今後対策が必要です。



1. 各地区の生育状況について(6月11日現在)


①JA全体

栽培区分	年度	移植日(平均)	草丈(cm)	茎数(㎡)	葉色
移植	R7	4月27日	36.7	329.3	4.3
	R6	4月29日	36.2	397.0	4.4

②各地区の状況

栽培区分	地区	移植日(平均)	草丈(cm)	茎数(本/㎡)	葉色
移植	福井	4/24	37.8	318.7	4.4
	坂井	4/29	32.4	261.0	3.9
	丹南	4/27	37.5	479.0	4.4
	嶺南	4/30	39.2	258.6	4.5

2. 茎数の推移



3. シャインパール栽培のポイント

●坂井地区直播(4/26播種 6/9現在)



溝切りと中干し

良質な米づくりと収量の向上には、適正な茎数を確保することが重要となります。必要な茎数を確保した後は、適期溝切りと中干しを実施しましょう! いもち病や紋枯れ病などの病害予防も忘れずに!

■溝切りの効果

- 水管理(排水)を容易にする
- 収穫直前まで通水が可能となり、品質向上につながる
- 地耐力アップで機械収穫を容易にする

■溝切りのポイント

- 排水不良の湿田では溝切り本数を多めにする
- 溝切後は排水口にしっかり接続する



・深さ: 10cm以上

【溝切り目安】

・間隔: 3～5mに1本

県域多収米「シャインパール」のお問い合わせは、各地区担当営農指導員までお願いします。