



シャインパール7 速報

WORLD. RICE

【No.6】

●幼穂形成期以降は間断通水を実施しましょう!!

6月中下旬にかけ高温多照の日が多く続き、稲の生育も活発となり、急激に茎数が増加しました。各地区で中干しの実施中ですが、今週末を目安に終了してください。中干し終了後、幼穂形成期を迎えますので間断通水を実施し、適切な水管理をしましょう!



1. 各地区の生育状況について(6月25日現在)


①JA全体

栽培区分	年度	移植日(平均)	草丈(cm)	茎数(m ²)	葉色
移植	R7	4月27日	63.3	540.1	4.4
	R6	4月29日	59.9	567.4	4.3

②各地区の状況

栽培区分	地区	移植日(平均)	草丈(cm)	茎数(本/m ²)	葉色
移植	福井	4/24	64.2	506.8	4.3
	坂井	4/29	62.8	561.7	4.6
	丹南	4/27	67.6	658.5	4.1
	嶺南	5/2	58.7	433.3	4.6

2. 茎数の推移



【平年比】


■草丈: 長い ■茎数: 少ない ■葉色: 平年並み



3. シャインパール栽培のポイント

嶺南地区(4/30移植、6/25現在)

シャインパールの収量を高めるため、生育状況(茎数と葉色)を確認して、穂肥と防除を行いましょう。



県域多収米「シャインパール」のお問い合わせは、各地区担当営農指導員までお願いします。