輸出用米の多収で世界に挑む!!

令和７年7月4日

JA福井県
多収米協議会

シャインパール7速報

WORLD. RICE

【No.7】

●幼穂形成期を迎えたら間断通水を行いましょう

７月５日（土）・６日（日）は県下一斉の畦畔草刈り実践デーです。地域ぐるみでカメムシの生息場所となる水田周辺の草刈りを実施し、カメムシ対策を行いましょう。６月下旬から７月初旬にかけても高温・多照の日が多く、茎数は十分に増加しています。幼穂形成期を迎えた圃場については、間断通水を実施し、適切な水管理を行いながら根の活力維持に努めましょう。

1. 各地区の生育状況について（7月2日現在）

①JA全体

栽培区分	年度	移植日（平均）	草丈（cm）	茎数（㎡）	葉色
移植	R7	4月27日	77.0	550.1	4.3
	R6	4月29日	71.6	554.9	4.4

②各地区の状況

栽培区分	地区	移植日（平均）	草丈（cm）	茎数（本/㎡）	葉色
移植	福井	4/24	79.7	539.5	4.2
	坂井	4/29	76.3	540.5	4.4
	丹南	4/27	79.9	606.0	4.0
	嶺南	5/2	72.2	514.3	4.7

2. .茎数の推移



【平年比】
■草　丈：長い　■茎　数：やや少ない　■葉　色：平年並み

坂井市丸岡町生育状況 5/3移植　7/1現在

3. シャインパール栽培のポイント

元肥一括肥料を施用していても、生育が弱い場合は、幼穂形成期に窒素成分で1～2kg/10aの追肥を行う。

葉色の低下（肥料不足）は、未熟粒や乳白粒の増加で、低単収・等級落ちに!!



【穂肥の施用】
□ 肥　料　：　CV532　又は　ｱｸﾞﾘﾌﾗｯｼｭ444
□ 施肥量　：　7～14kg/10a（N：1～2kg）

【病害虫】
紋枯病　　：リンバー粒剤　3～4kg/10a
　　（穂ばらみ期までに散布）
ニカメイチュウ：パダン粒剤　3～4kg/10a
　　（7月20日頃までに散布）

県下一斉　畦畔草刈り実践デー
地域ぐるみの草刈りでカメムシの発生や帰化アサガオ類を減らしましょう。

- 7月 5日（土）
- 7月 6日（日）

県域多収米「シャインパール」のお問い合わせは、各地区担当営農指導員までお願いします。