

# フクムギ情報

福井県産【大麦・小麦】の  
収量アップを目指して！！

JA福井県  
No.6

(ファイバースノウ・はねうまもち)

本年は3月下旬から気温が高く推移し、地域によっては出穂が平年より早くなっています。  
生育が早いところでは5月下旬頃が刈取開始時期となりますので、準備をして適期での収穫作業を行いましょう。

## 1. 大麦・小麦施設稼働状況（刈取時期）

- 各地区の麦の出穂状況と刈取予測をまとめました。

地域によっては、出穂が前年より早まっています！！

福井地区（施設日程調整中）

| 品種名      | 出穂期<br>(平均) | 施設受入  |
|----------|-------------|-------|
| はねうまもち   | 4/11        | 5/25～ |
| 県大3号(小麦) | 4/6         | 6/3～  |

丹南地区

| 品種名    | 出穂期<br>(平均) | 施設受入 |
|--------|-------------|------|
| はねうまもち | 4/14        | 6/2～ |

坂井地区

| 品種名      | 出穂期<br>(平均) | 施設受入  |
|----------|-------------|-------|
| ファイバースノウ | 4/10        | 5/25～ |

奥越地区

| 品種名      | 出穂期<br>(平均) | 施設受入 |
|----------|-------------|------|
| ファイバースノウ | 4/18        | 6/3～ |

嶺南地区

| 品種名    | 出穂期<br>(平均) | 施設受入  |
|--------|-------------|-------|
| はねうまもち | 4/8         | 5/26～ |

★大麦の詳細な収穫時期（施設受入）や赤かび病の発生が疑われた場合は、  
収穫前に担当の営農指導員へご相談ください。


## 2. カラスノエンドウによる問題

- 近年、カラスノエンドウが畦際を中心に多発しています。種子が大麦に混入すると、選別除去が困難であり、産地としての信頼が下がります。莢が黒くなる前に手取り除草を実施し、莢が付いたものは圃場外（畦畔等での放置×）に持ち出して処分しましょう。



## 3. 麦類の適期収穫 ……大麦の収穫適期は穀粒水分25%以下（水分30%から刈り取り開始）


### ①水分低下のモデル



- 穀粒水分は55～40%程度までは1.2～1.6%/日、40%～収穫適期までは2.1～3.2%/日の割合で低下する傾向にある。
- 収穫後は4時間以内に通風乾燥する。  
(収穫始めなど、水分が高い時は乾燥開始を早める。)

※ 水分は成熟期前に晴れが続くと急速に低下し、降雨で水分が一時的に高まっても天候回復後に戻る。

今年は5月中旬が好天だったため、収穫時期が早まっている。



### ②収穫時期目安（出穂期から積算で概ね750℃）

- ・穂軸・茎葉が黄化している
- ・粒を爪先で押しつぶしたとき弾力性がなく、ろうの硬さ
- ・水分が30%を切ると、米麦水分計で確認可能