



WORLD. RICE

JA福井県

【No.2】

5月中は好天が続き例年比20%を上回る長い日照時間を観測したほか、観測史上最高の高温を記録しました。  
6月の天候の見通しは高温になることが予測されています。

高温が予想されていますので、中干しの実施時期や強度に注意して、乾きすぎないように水管理を実施してください。

## 1. 各地区の生育状況について(6月3日現在)


### ①JA全体(移植)

| 年度 | 移植日<br>(平均) | 草丈<br>(cm) | 茎数<br>(本/m <sup>2</sup> ) | 葉色  |
|----|-------------|------------|---------------------------|-----|
| R8 | 4/28        | 37.3       | 334.8                     | 4.1 |
| R7 | 4/26        | 32.1       | 211.3                     | 3.3 |
| R6 | 4/29        | 32.0       | 244.4                     | 4.3 |

### ②各地区の状況(移植)

| 地区 | 移植日<br>(平均) | 草丈<br>(cm) | 茎数<br>(本/m <sup>2</sup> ) | 葉色  |
|----|-------------|------------|---------------------------|-----|
| 福井 | 4/22        | 39.8       | 329.8                     | 4.6 |
| 坂井 | 5/1         | 31.1       | 329.8                     | 3.4 |
| 丹南 |             | 39.3       | 418.5                     | 4.2 |
| 嶺南 | 5/2         | 39.0       | 261.1                     | 4.1 |

## 2. 茎数の推移について(6月3日現在)



好天(高温・多照)が続いたため、生育は良好。昨年に比べ約1週間程度早くなっています。生育状況は気象条件次第で大きく変動するため、今後も細やかな栽培管理を心がけましょう。

### ①生育状況(前年比)

- 草丈 : 長い
- 茎数 : 多い
- 葉色 : 濃い

### ②気象状況: 5月29日～6月3日(平年比)

- 平均気温 : 高温(2.2℃/日)
- 降水量 : 多雨(3.4mm/日)
- 日照量 : 多照(1.4時間/日)

## 3. シャインパール栽培のポイント

### ①中干しの実施

中干しは多収穫を図るために大変重要な管理です。来週に茎数350本/m<sup>2</sup>の見込みです。茎数を確認して中干しを実施しましょう。

#### 【中干しの効果】

- 無効分げつ抑制
- 受光体制の向上
- 根の活性化


#### 【中干し開始の目安】

- 移植後30～40日ごろ

- 50株 → 茎数: 20本/株
- 60株 → 茎数: 18本/株

### ②溝切り準備(機械点検)

溝切り機の使用前に点検を行いましょう。



県域多収米「シャインパール」のお問い合わせは、各地区担当営農指導員までお願いします。