

高温に強い特性と多収を活かし、所得向上の架け橋へ！

令和8年6月5日

JA福井県
多収米協議会

多収米

にじのきらめき

RAINBOW RICE

速報
[No.2]

29日からは、全国的に晴れて一段と気温が上がりました。最高気温が32℃とまるで夏の暑さとなり、この暑さは、週明けまで強い日差しと高い湿度で蒸し暑く感じられました。なお、6月上旬は南の海上に梅雨前線が停滞し前線の南側からの台風の北上にともない、梅雨前線の今後の活動に影響を及ぼす可能性があります。今年の梅雨入りは前線が日本の南に大きく南下しているため、北上し日本に影響しやすくなるのは6月上旬の後半になる見込みです。今後は周期的に天候がかわる梅雨はしりとなる予報です。

1.生育状況について(6月3日現在)

①JA全体(移植)


年度	移植日 (平均)	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉色
R8	5/9	33.2	212.9	4.2
R7	5/10	28.7	148.0	4.4
R6	5/20	25.2	63.7	3.5

- 高温の影響で生育が早く進み、昨年に比べて草丈は長く、茎数は多く、葉色はやや薄い状況です。

②各地区の状況(移植)

地区	移植日 (平均)	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉色
福井	5/14	31.7	131.0	4.1
坂井	5/13	32.4	207.3	3.8
奥越		30.4	219.0	4.2
丹南	5/3	39.9	353.0	4.7
嶺南	5/7	31.4	154.0	4.3

2.茎数の推移について(6月3日現在)



気象状況: 5月29日～6月3日(平年比)

- 平均気温 : 高温(2.2℃/日)
- 降水量 : 多雨(3.4mm/日)
- 日照量 : 多照(1.4時間/日)




丹南営農経済センター管内(田植え日: 5月8日)

3.にじのきらめきの栽培ポイント

- 田干し・浅水管理 : ワキ(ガス)の発生があり稲の生育が停滞し、葉が黄化した場合は落水(1～2日)の田干しで、根の活力低下を防ぎましょう。

- 雑草対策 : 浅水管理による雑草の発生や、例年雑草が多発する圃場では、こまめに観察し早期の対応を行いましょう。



雑草区分	資材名	形状
ヒエ	クリンチャー	粒・EW
広葉	中後期剤	粒
	バサグラン	粒・液

県域多収米「にじのきらめき」のお問い合わせは、各地区担当営農指導員までお願いします。